- **Ultrassonografia Vascul ar | Caso Clínico**

(11170) - ANEURISMAS DISSECANTES CAROTÍDEOS E VERTEBRAIS EM DOENTE COM SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS TIPO VASCULAR

Filipe Fernandes^{1,2}

1 - King's College Hospital NHS Foundation Trust; 2 - King's College London

A síndrome de Ehlers-Danlos tipo vascular (vEDS) consiste numa rara doença genética do tecido conjuntivo com uma prevalência entre 1/50.000 e 1/200.000, representando cerca de 5-10% da generalidade dos casos de síndrome de Ehlers-Danlos. Podendo afetar qualquer território vascular, a vEDS compromete mais frequentemente os troncos supra-aórticos resultando em diagnósticos típicos de aneurismas e dissecções carotídeas e vertebrais. O presente caso clínico descreve o diagnóstico e seguimento clínico de um paciente de 27 anos com antecedentes clínicos de acidente vascular cerebral, tendo-lhe sido diagnosticado a vEDS originando aneurismas dissecantes bilaterais das artérias carótidas internas e artérias vertebrais. Devido ao risco acrescido das técnicas de imagem invasivas nestes doentes, realça-se o papel preponderante da ultrassonografia vascular na avaliação desta enfermidade.

Palavras-chave : Ultrassonografia vascular, Síndrome de Ehlers-Danlos, Aneurisma, Dissecção